

Chinakohl

[Brassica pekinensis Lour. Rupr.]

Sorte	Kulturzeit im Sommer in Tagen	Pflanzen / ha in Tausend	Kopfgewicht in kg	Pflanztermin in KW	Resistenz IR	Bemerkung
grün						
Bilko F1 	70	40 - 80	1,2 - 2,0	27 - 34		mittellanger Typ für den Sommer- und Herbstanbau
Kiseki F1	60	40 - 80	1,3 - 1,8	15 - 33		sehr dunkelgrüne Rahmenblätter, gute Kältetoleranz, stark gegen Tipburn, Hitze- und Pfefferflecken
Manoko F1 	60	80 - 90	0,8 - 1,2	9 - 34		zuverlässige Sorte für die ganze Anbauperiode, schossfest im Frühanbau
Sprinkin F1	55	80 - 90	1,0 - 2,0	10 - 33		Standardsorte im Frühbereich, sehr schossfest
Veraflex F1	55	40 - 80	1,5 - 2,7	14 - 34	Foc/VW	ganzjähriger Anbau, hohe Verticillium-Toleranz, schwere, geschlossene Köpfe, ausgezeichnete Feldhaltbarkeit
rot						
Scarnade F1	70	60	1,2 - 1,5	23 - 33		Roter Granate-Typ, für Frischmarkt und Salat, tolerant gegen Blattrandnekrose, schossfest
Scarvita F1	75	40 - 85	1,5 - 2,0	23 - 33	Pb	purpurroter halblanger Chinakohl für den Sommer- und Herbstanbau



Scarvita F1

Sommer- und Herbstanbau
halblanger Chinakohl
purpurrote Farbe



Bilko F1

sehr gute Lagereignung
hohe Resistenz gegen Kohlhernie
leicht zu ernten



Green Parrot F

ganzjähriger Anbau mög.
aufrecht und kompakt
gute Feldhaltbarkeit

Green Falcon F1

mittelgrüner Typ
hohe Schosstoleranz
Innenbrandtolerant



Pak Choi

[Brassica rapa subsp. chinensis]

Sorte	Kulturzeit in Tagen	Pflanzung	Farbe	Bemerkung
Green Falcon F1	42 - 49	ganzjährig	grün	mittelgrüner Shanghai-Typ mit hoher Schosstoleranz, ganzjähriger Anbau möglich, 42 - 49 Tage Kulturdauer bei Direktsaat, Innenbrandtolerant
Green Parrot F1	45 - 54	ganzjährig	grün	Dunkelgrüner Shanghai-Typ, hohe Schosstoleranz, ganzjähriger Anbau möglich, aufrechte und kompakte Sorte, gute Feldhaltbarkeit