



# Radicchio

[Cichorium intybus L Goliosum]

**Leonardo**  
hohes Kopfgewicht  
für den Herbstanbau



Sorte	Farbe	empfohlene Anbauzeit in KW	Bemerkung
Leonardo 	intensiv rot	23 - 30	hohe Kopfgewichte, kurzfristige Lagerung möglich, Herbstanbau
Vasari 	intensiv rot	18 - 30	große, flachrunde Köpfe von herausragender Farbqualität

# Zuckerhut

[Cichorium intybus]



Sorte	Wachstumstage	empfohlene Anbauzeit in KW	Bemerkung
Uranus 	85	18 - 33	lange Köpfe von sehr guter Qualität, kurz lagerfähig

# Bataviasalat

[Lactuca sativa var. capitata]

**Gylona**  
großer, offener Batavia  
frischgrüne Farbe



Sorte	Typ	Farbe	empfohlene Anbauzeit	Resistenz HR	Resistenz IR	Bemerkung
Gylona 	offen	grün	8 - 34	Bl:29-41EU/ Nr:0/TBSV	LMV:1/ Fol:1,4	großer, offener Batavia mit viel Blatt, hohe Innenbrandtoleranz, für Frühjahrs- bis Herbstanbau
Oxela 	ofen	grün	14 - 32	Bl:29-41EU/ Nr:0	LMV:1	robust und schossfest bei Hitze, ausgezeichnete Haltbarkeit, optimale Kopfgröße mit guter Füllung
Voltron	offen	grün	14 - 35	Bl:16-37EU/ Nr:0	LMV:1/Fol:1	grün, offen, Freiland, kugelige Form, mittelfein gekraustes Blatt, robust, stark gegen Schossen und Innenbrand

Viren - LMV: Lettuce Mosaic Virus (salatmosaikvirus) LMV:1, Ss: Sphingomonas suberifaciens (ex Rhizomonas suberifaciens) (Korkwurzel) / Pilze - Bl: Bremia lactucae Bl:16-41EU (Falscher Mehltau), Fol: Fusarium oxysporum f. sp. lactucae Fol:1,2 / Schädlinge - Nr: Nasonovia ribisnigri Nr:0 (grüne Salatlaus), Pb: Pemphigus bursarius (Salatwurzellaus), Me: Macrosiphum euphorbiae